

# のり漁場栄養塩情報 (平成 24 年 2 月 29 日)

宮城県のり養殖安定化対策本部

担当機関：宮城県漁業協同組合

仙台地方振興事務所水産漁港部

水産技術総合センター

- ・三態窒素濃度は石巻湾、宮戸西部で  $2 \mu\text{g-at/L}$  未満と、依然として低くなっています。

【栄養塩濃度の単位  $\mu\text{g-at/L}$ 】

漁場名		採水日	リン酸態リン	三態窒素	色調	水温(°C)	備考
石巻湾	生草	2月25日	0.2	1.6	2等級		
		2月26日	0.1	0.4	1等級		
		2月27日	0.2	0.7	2等級		
	佐須	2月22日	0.1	0.7	1等級		
		2月23日	0.1	0.6	1等級		
宮戸西部	月浜	9月22日	0.1	0.5		5.0 水技セ調査	

※三態窒素とは硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素の合計です。

※三態窒素濃度が 5 以上で色調が維持され、3 を下回るようになると色落ちする傾向にあります。

色調は、のり研幹事情報及び水産技術総合センター調査に基づいています

次回ののり養殖通報は平成 24 年 3 月 7 日 (水) を予定しています。