

せんなん感染症情報 令和7年2月号

宮城県感染症発生動向調査 第2週～第5週より（令和7年1月6日～令和7年2月2日）

仙南保健所管内の全数報告疾病

- 1類感染症：報告なし
- 2類感染症：報告なし
- 3類感染症：報告なし
- 4類感染症：報告なし
- 5類感染症：侵襲性肺炎球菌感染症 男性1名
梅毒 男性1名（第2週）

仙南保健所管内の感染症警報・注意報

第5週現在、警報、注意報はありません。

宮城県仙南保健所



仙南保健所オリジナルキャラクター「てあらっこ」

2（ふう）月 4（しん）日は「風疹の日」

風疹とは

- ・風疹ウイルスによって引き起こされる**急性の風疹ウイルスによっておこる急性の発疹性感染症**で、風疹への免疫がない集団では、1人の風疹患者から5～7人にうつす**強い感染力**を有します。
- ・風疹ウイルスの感染経路は、**飛沫感染**で、ヒトからヒトへ感染が伝播します。
- ・成人で発症した場合は**高熱**や**発疹**が長く続いたり、**関節痛**を認めるなど、小児より重症化することがあります。
- ・風疹に対する免疫が不十分な**妊娠20週頃までの妊婦**が風疹ウイルスに感染すると、**先天性風疹症候群の子ども**が生まれてくる**可能性**が高くなります。

先天性風疹症候群とは

- ・風疹に対する免疫が不十分な**妊娠20週頃までの女性**が風疹ウイルスに感染すると、**眼や心臓、耳等に障害をもつ（先天性風疹症候群）子ども**が出生することがあります。
- ・妊娠中の女性は予防接種が受けられないため、流行地域においては、**抗体を持たない又は抗体価の低い妊婦は、可能な限り不要不急の外出を避けて**いただき、やむを得ず外出をする際には可能な限り人混みを避けるなど、風疹にかからないように注意してください。
- ・また、妊婦の周囲の人（妊婦の夫、子ども、その他の同居家族等）は、風疹に感染しないように予防に努めましょう。



ワクチンが最も有効な予防法です。

- ・風疹は**予防接種が最も有効な予防方法**です。
風疹のみ患歴や予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。
- ・風疹ワクチン（主に接種されているのは、麻しん風疹混合ワクチン）を接種することによって、**95%以上の人が風疹ウイルスに対する免疫を獲得**することができますと言われてています。また、2回の接種を受けることで1回の接種では免疫が付かなかった方の多くに免疫をつけることができます。

インフルエンザ予防の換気

対角線上のドアや窓を**2か所開放**する。
窓が1つしかない場合は、部屋のドアを開けて、扇風機などを窓の外に向けて設置しましょう。



せんなん感染症情報はこちらから



宮城県感染症発生動向調査【週報】はこちらから

