

令和8年度生育モニタリングの生育状況(宮城県古川農業試験場)

(令和8年8月18日現在)

1 だて正夢(移植栽培)

品種名	播種日 (月/日)	移植日 (月/日)	生育状況(8月8日現在)				参考
			出穂期		穂揃期葉色		成熟期
			本年値	平年値	本年値	平年差	平年
だて正夢	4/14	5/11	8/8	8/3	38.7	3.9	9/16
(参考) ひとめぼれ	4/14	5/11	8/4	8/1	32.7	0.1	9/12

注) 稚苗、栽植密度: 18.5本/m²、基肥: 5.0kg/10a

・だて正夢の穂揃期葉色は平年よりも3.9ポイント高く、生育ステージは出穂期が8/8と平年より5日程度遅れている。

2 直播栽培

(1) 生育状況

1) ひとめぼれ(乾田直播) ※前年との比較

品種名	播種日	出芽揃日	生育状況(8月18日現在)				参考
			出穂期		穂揃期葉色		成熟期
			本年値	前年値	本年値	前年差	前年
ひとめぼれ	4/13	6/1	8/13	8/8	36.8	0.7	9/20

注) 播種方式: グレーンドリル鎮圧、播種量: 5.2kg/10a、基肥: 11.0kgN/10a

2) ひとめぼれ(湛水直播) ※令和6年との比較

品種名	播種日	出芽揃日	生育状況(8月18日現在)				参考
			出穂期		穂揃期葉色		成熟期
			本年値	令和6 年値	本年値	令和6 年差	令和 6年
ひとめぼれ	5/12	5/28	8/13	8/7	34.1	2.1	9/17

注) 播種方式: 鉄コーティング、播種量2.1kg/10a、基肥: 5.0kgN/10a

・乾田直播の穂揃期葉色は前年よりも0.7ポイント高く、生育ステージは出穂期が8/13と前年より5日程度遅れている。

・湛水直播の穂揃期葉色は令和6年より2.1ポイント高く、生育ステージは出穂期が8/13と令和6年より6日程度遅れている。

3 栽培管理

(1) 共通

- ・水管理は、収量・品質向上のため、間断かん水または飽水管理とし、落水は出穂後30日以降とする。
- ・収穫用機械、乾燥調製施設等の点検・整備を早めに行う。
- ・適期刈取りと適正な乾燥調製で良質米生産を目指す。

(2) だて正夢

- ・基本的な管理は「ひとめぼれ」に準じて実施する。

※今年度は今回で終了となります。