


令和8年度 ホタテガイ採苗通報(臨時)

令和8年7月29日



宮城県

気仙沼水産試験場 TEL:0226-41-0652 FAX:0226-41-0743
E-mail:kssuisan@pref.miyagi.lg.jp
HP:http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kesenmuma-s/
気仙沼地方振興事務所水産漁港部 TEL:0226-22-6852
水産技術総合センター TEL:0225-24-0138
県漁協各支部青年部・研究会

- ・採苗稚貝数は、1採苗袋あたり245～1,114個でした。
- ・調査地点によって殻長組成にバラツキがあり、北部地区では4mm以下が主体です。
- ・害敵生物について、ヒトデ類の混入は1地点で確認され、コツブムシ(ダンゴムシに似た生物)が、北部地区のすべての調査点で確認されました。
- ・今後の稚貝採取にあたっては、気象・海況の動向に注意して作業を実施してください。

表 各調査点の付着稚貝数(採苗袋あたり)


調 査 点		垂下期間 投入－回収	垂下水深 m	稚貝数	殻 長 組 成(mm)						害 敵 生 物	
					4以下	4～6	6～8	8～10※ ¹	10～12※ ²	12以上	ヒトデ [*] 類	コツブムシ
北部地区												
大谷	大沢	5/11～7/23	10	417	388 (93%)	17 (4%)	3 (1%)	4 (1%)	4 (1%)	1 (0%)	0	4
	赤牛	5/3～7/23	10	353	311 (88%)	9 (3%)	4 (1%)	5 (1%)	12 (3%)	12 (3%)	0	9
本 吉	蔵内	6/2～7/22	10	367	331 (90%)	29 (8%)	7 (2%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1	8
	蔵内	6/10～7/22	10	565	564 (100%)	1 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0	1
歌 津	泊	5/3～7/9	15	245	228 (93%)	6 (2%)	2 (1%)	9 (4%)	0 (0%)	0 (0%)	0	5
中部地区												
十三浜	双子沖	4/23～6/25	15	498	198 (40%)	300 (60%)		0 (0%)		0 (0%)	0	0
	双子沖	5/3～6/25	15	280	120 (43%)	160 (57%)		0 (0%)		0 (0%)	0	0
女川	出島	5/5～7/9	7	1,114	付着直後 1～2mm		3～14mm			0	0	
					200 (18%)	752 (68%)	162 (15%)					

注 ※1：2分目以下のホタテネット(パールネット)で稚貝採取可能
※2：2分5厘目以下のホタテネット(パールネット)で稚貝採取可能

令和8年度 ホタテガイ採苗通報(臨時)

【海況情報】

〈国立研究開発法人水産研究・教育機構「改良版我が国周辺の海況予報システム(FRA-ROMSⅡ)」から抜粋〉



【気象情報】

東北地方1カ月予報(令和8年7月23日発表)(気象庁HPから抜粋)

東北地方 1か月予報 (07/25～08/24)		
2026年07月23日14時30分 仙台管区気象台 発表		
特に注意を要する事項		2週目は気温がかなり高くなる可能性があります。
向こう1か月 07/25～08/24	天候	東北日本海側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。
	気温	平均気温は、高い確率50%です。
1週目 07/25～07/31	気温	1週目は、平年並の確率50%です。
2週目 08/01～08/07	気温	2週目は、東北日本海側で高い確率60%、東北太平洋側で高い確率50%です。
3～4週目 08/08～08/21	気温	3～4週目は、高い確率50%です。

・ 採苗袋を提供いただいた関係者の皆様、ありがとうございました。